

ULCERAS PEPTICAS


Información importante sobre su salud

Una llaga causada por el desgaste de la mucosa que recubre el estómago o del duodeno (la parte superior del intestino delgado) es llamada una úlcera péptica. La principal causa es la bacteria llamada Helicobacter Pylori (H.Pylori), y el uso por largo periodo de tiempo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina y el ibuprofeno.

Las Úlceras pépticas son bastante comunes, alrededor de medio millón de personas desarrollan una úlcera péptica cada año en los estados unidos. La infección por H.Pylori es bastante común e infectan a personas en la infancia. Aún no es completamente claro cómo el H. Pylori es transmitido, los alimentos que no han sido lavados o cocidos apropiadamente y el agua "potable" contaminada pueden ser dos fuentes probables.

La bacteria H. Pylori causa úlceras pépticas dañando la mucosa protectora que recubre el estómago o duodeno, este daño permite que el ácido del estómago atraviese el revestimiento haciendo posible que se combine con la bacteria H. Pylori causando así el desarrollo de la úlcera.

Sin embargo, la mayoría de personas infectadas con H.Pylori nunca desarrollan úlceras. La razón por la cual la bacteria causa úlceras en ciertas personas y no en otras es desconocida. Es probable, que el desarrollo de las úlceras dependa de cómo el sistema inmune de cada persona responde a la bacteria, el tipo de H. Pylori presente y otros factores que aún no han descubiertos.



Sintomas:

Aunque la mayoría de las personas sólo experimenta síntomas leves o ninguno. El malestar abdominal es el sintoma mas comun tanto de las ulceras gastricas como de las úlceras de duodeno. Este malestar se ubica entre el ombligo y el esternón y sus síntomas pueden describirse como:


- Dolor agudos y quemazón
- Dolor cuando el estomago esta vacio es decir entre comidas o durante la noche
- Pueden sentirse un pequeño alivio al comer alimentos (solo para úlceras duodenales)
- Pueden sentirse un pequeño alivio tomando antiácidos (para úlceras gástricas o duodenales)
- Durar de minutos a horas
- Ir y venir por varios días o semanas

Otros síntomas de una úlcera péptica incluyen:

- Pérdida de peso, falta de apetito, hinchazón, eructos, náuseas, vómitos

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato:

- Dolor de estómago agudo, repentino, persistente y severo
- Heces fecales con sangre o negras
- Vómito con sangre o vómito que parece café molido





Para más información:

American College of Gastroenterology

P. O. Box 342260
Bethesda, MD 20827-2260
Teléfono: 301.263.9000
Internet: www.acg.gi.org

American Gastroenterological Association

4930 Del Ray Avenue
Bethesda, MD 20814
Teléfono: 301.654.2055
Internet: www.gastro.org

Diagnostico:

Un diagnóstico preciso es importante para que el médico pueda determinar el mejor tratamiento para cada caso. Si es necesario realizar una endoscopia superior, entonces, el gastroenterólogo puede remover pequeñas muestras de tejido (Biopsias). Estas biopsias son luego examinadas microscópicamente por el patólogo - médico que se especializa en el diagnóstico de enfermedades por medio de la examinación microscópica de una muestra de tejido- para determinar que enfermedad o condición tiene. El diagnóstico del patólogo es la clave para determinar el tratamiento a seguir.

Tratamiento:

Generalmente las úlceras inducidas por H. Pylori son tratadas con medicamentos que matan la bacteria, reducen el ácido estomacal y protegen la mucosa protectora del estómago y del duodeno. Los tratamientos con antibióticos son diferentes para cada caso, ya que depende del tipo de H. Pylori presente, algunos tipos de esta bacteria se han vuelto resistentes a ciertos antibióticos. También se utilizan medicamentos que reducen el ácido estomacal, como los inhibidores de la bomba de protones o los bloqueadores de receptores de histamina (bloqueadores H 2). Ambos medicamentos reductores de ácido ayudan a aliviar el dolor de úlcera péptica después de algunas semanas y promueven la curación de esta.

Preguntas Importantes:

- Como se pueden prevenir futuras infecciones de H. Pylori?
- Cual es el mejor tratamiento para mi diagnostico?
- Cuales son los posibles efectos secundarios del tratamiento?
- Que otros análisis son necesarios?

Notas del Médico:



11025 RCA Center Drive, Suite 300
Palm Beach Gardens, FL 33410

www.auroradx.com

Este folleto proporcionado por Diagnosticos Aurora, esta destinado a proveer información, y solo puede ser utilizado con fines educacionales. Este no constituye un consejo sobre su salud, ni debe considerarse como el reemplazo de la atención medica suministrada por un profesional. Las opciones de tratamiento, pueden variar y estas dependen de factores como su historial medico y su salud actual. Solo un médico y usted pueden determinar la mejor opción.

[14707] ADX-GI Peptic Ulcers